

نگاهی رویکردی به دگراماتازون قاتل خاموش جامعه ایران

دکتر مژگان مهاجری ایروانی^۱، دکتر مجید نکوفرد^۲، پوریا عبدالمالکی^۳، امیدعلی وندائی^۴

چکیده

مقدمه و هدف: دگراماتازون از دسته کورتیکواستروئیدهای صناعی (کورتون) و طولانی اثر است که دارای اثرات بارز ضدالتهابی و ضدحساسیت می‌باشد و مصرف مقدار کم این دارو به مدت کوتاه که در موارد درمانی تجویز می‌شود به ندرت عوارض جانبی دارد. اما با این وجود، درمان طولانی مدت یا مصرف زیاد این دارو می‌تواند عوارض جانبی ناخوشایند و خطربناکی را به دنبال داشته باشد. **روش بررسی:** پژوهش حاضر حاصل یک مطالعه مروی می‌باشد که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از جستجوی منظم منابع پایگاه‌های اینترنتی از جمله Google scholar، Magiran و تحقیقات منتشر شده مرتبط با موضوع و مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است.

یافته‌ها: عوارض نامطلوب ناشی از مصرف نابجا و بی‌رویه دگراماتازون با اشکال مختلف می‌تواند منجر به کاهش سد دفاعی بدن در مقابل انواع عفونت‌ها، تاخیر در ترمیم زخم‌ها، ایجاد عوارضی مانند افسردگی، توهمندی و همچنین اختلالات ذهنی، اثر بر تعادل مایعات و الکترولیت‌های بدن، تاثیر بر توزیع چربی‌ها در بدن، افزایش فشارخون، افزایش قندخون و ایجاد دیابت کاهش تراکم استخوان‌ها و پوکی استخوان، کاهش و تضعیف لایه‌های مخاطی دستگاه گوارش بویژه معده که باعث بروز و تشید زخم‌های گوارشی و... گردد.

بحث و نتیجه‌گیری: هر چند کاربرد وسیع داروی دگراماتازون مانند تمام داروها می‌تواند درمانگر و نجات بخش باشد، از سوی دیگر می‌تواند عوارضی را نیز بر جای بگذارد. از آنجا که کورتون‌ها جز داروهای پرعارضه محسوب می‌شوند، توجه دقیق بر مصرف صحیح و آگاهانه آنها و پرهیز از تجویز و مصرف نابجا و بی‌رویه این داروها از سوی پزشکان و همچنین بیماران بسیار حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی: دگراماتازون، کورتیکواستروئید، ضد التهابی

مقدمه

دگراماتازون به دلیل خواص ضد التهابی که دارند، جزو داروهای بسیار پر مصرف است و به صورت بی‌رویه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند که آشنایی با خواص و عوارض بعدی آن می‌تواند در کنترل مصرف این دارو مؤثر باشد. مصرف مقدار کم این دارو به مدت کوتاه که در موارد درمانی تجویز

داروی دگراماتازون از دسته کورتیکواستروئیدهای صناعی (کورتون) و طولانی اثر است که دارای اثرات بارز ضد التهابی و ضدحساسیت بوده و باعث کاهش درد ناشی از فرایندهای التهابی بویژه در محل مفاصل می‌شود. همچنین سرکوب سیستم ایمنی بدن را نیز سبب می‌شود. این اثرات دارو می‌تواند اغلب سیستم‌های مختلف بدن

۱- عضو هیئت علمی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های بویژه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

۲- عضو هیئت علمی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های بویژه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

۳- دانشجوی کارشناسی پیوسته هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش (**نویسنده مسئول)

تلفن: ۰۹۳۹۸۷۲۲۸۰۸ آدرس الکترونیک: Pooriya.abdolmaleki1370@gmail.com

۴- دانشجوی کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

اما عوارضی که پس از قطع دارو اتفاق می‌افتد و در صورت بروز سریعاً باید به پزشک مراجعه نمود، موارد ذیل هستند: کاهش سریع وزن، خستگی و ضعف غیر معمول، استفراغ، درد شکم، معده و پشت، سرگیجه، غش و تب، کاهش دائمی اشتها، درد عضله و مفصل، برگشت علائم بیماری، کوتاهی تنفس، سردرد عجیب دائمی یا متناوب.

از طرفی عوارض نامطلوب ناشی از مصرف نابجا و بی‌رویه آمپول دگراماتازون مشتمل بر این موارد است: تضعیف سیستم ایمنی بدن و کاهش سد دفاعی بدن در مقابل انواع عفونت‌ها، به تاخیرانداختن ترمیم زخم‌ها، ایجاد عوارضی مانند افسردگی، توهم و همچنین اختلالات ذهنی و پیدایش حملات مانیا و جنون، اثر بر تعادل مایعات و الکترولیت‌های بدن که منجر به احتباس نمک و آب در بدن و در نهایت ادم (ورم) می‌شود، تاثیر بر توزیع چربی‌ها در بدن و به دنبال آن تجمع چربی‌ها در نواحی خاص بدن مانند پشت بدن و پشت گردن، افزایش رشد موهای زائد در نواحی مختلف بدن مانند صورت بویژه در زنان، افزایش فشارخون، افزایش قندخون (هیپرگلیسمی) و ایجاد دیابت و افزایش چربی‌های خون که همگی فاکتورهای شناخته شده و قوی برای بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و سکته‌های قلبی هستند، کاهش تراکم استخوان‌ها و پوکی استخوان و همچنین مصرف دوز بالای آن موجب پارگی و یا آسیب تاندون‌ها می‌شود، افزایش فشار داخل کره چشم و بروز آب سیاه بویژه در افراد مسن و همچنین بروز آب مروارید، کاهش و تضعیف لایه‌های مخاطی دستگاه گوارش بویژه معده که باعث بروز و تشدید زخم‌های گوارشی می‌شوند.

در سال‌های اخیر استفاده از قرص دگراماتازون برای افزایش وزن بویژه در میان جوانانی که به باشگاه‌های ورزشی مراجعه می‌کنند رواج یافته است.

این دسته دارویی یکی از انواع داروهای دوپینگ رایج در میان ورزشکاران دوپینگی است که متأسفانه مدتی است که در برخی باشگاه‌های بدنسازی به همراه سایر استروپیدهای آنابولیک (هورمون‌های مردانه) با وعده‌های دروغین و با قیمت‌های گراف به افراد تزریق می‌شود.

لازم به ذکر است که با وجود ظاهر پف آلود و افزایش وزنی که با مصرف کورتیکواستروئیدهایی نظیر دگراماتازون پدید می‌آید باید

می‌شود به ندرت عوارض جانبی دارد اما با این وجود، درمان طولانی مدت یا مصرف زیاد این دارو می‌تواند عوارض جانبی ناخوشایند و خطرناکی را به دنبال داشته باشد.

متأسفانه امروزه از این دارو علاوه بر موارد گفته شده، در باشگاه‌های پرورش اندام نیز به وفور استفاده‌های غیردرمانی می‌شود که به نظر می‌رسد دلیل استفاده از آن به سبب خاصیت جذب و حبس آب در بدن و ایجاد حالت پفکی در اندام‌ها باشد (۱).

روش بررسی

این مقاله از نوع مقاله‌های توصیفی کتابخانه‌ای است که به صورت مروری تنظیم شده است. در آن با استفاده از مقاله‌های علمی-پژوهشی، اطلاعات موتورهای جستجوی google و yahoo، همچنین پایگاه اطلاعاتی magiran و کتاب‌های موجود در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به جمع‌بندی آن پرداخته شده است.

یافته‌ها

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی دارای برخی عوارض ناخواسته نیز می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد ظاهر نمی‌شود ولی در صورت بروز هر کدام از آن‌ها باید با پزشک مشورت گردد.

از جمله عوارض دگراماتازون که در درمان کوتاه مدت ظاهر شده و نیاز به توجه پزشکی دارند، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: کاهش یا تاری دید، تکرر ادرار، تشنگی زیاد، احساس سوزش، خارش، بی‌حسی، ضعف ذهنی، درد و تورم، آرلژی و عفونت در محل تزریق، بی‌قراری، راش پوستی، درد در محل تزریق، گیجی، هیجان، توهم، درد و قرمزی چشم، حساسیت چشم به نور، آکنه، مدفوع خونی یا سیاه، سردرد، تغییر در ضربان قلب، اختلال در عادت ماهانه، درد و ضعف عضلانی، تهوع و استفراغ، درد در پشت، بازوها، پاها، تورم در پاها و صورت، توقف در رشد کودکان، اشکال در خواب، کبودی، ضعف و خستگی غیر معمول، افزایش سریع وزن، عدم بهبودی زخم‌ها، افزایش رشد موی سر و صورت، استئوپروز، افزایش اشتها، سوء هاضمه، خون دماغ، سکسکه، سرگیجه، بی‌قراری و عصی‌بودن، تیره یا روشن شدن پوست، گرگرفتگی صورت و گونه‌ها، افزایش درد مفاصل در تزریق داخل مفصلی، افزایش تعریق.

خصوصاً در میان افراد مسن شود.

باید توجه داشت که در صورت حساسیت به داروی دگزاماتارون و یا مبتلا بودن به عفونت‌های قارچی در هر ناحیه از بدن و یا در صورت داشتن بیماری خطرناک، تب، عفونت و یا جراحی از مصرف داروی دگزاماتازون اجتناب گردد (۳).

تجویز داروها و از جمله کورتیکواستروئیدها توسط پزشک با آگاهی و بررسی کامل مزایا و مضرات دارو در هر بیمار صورت می‌گیرد که این امر نیازمند داشتن اطلاعات و آگاهی دقیق از داروها و بیماری‌ها و نیز شرایط بیماران است. بر این اساس باید از مصرف خودسرانه داروها جدا خودداری کرد.

و اما آنچه که در این میان نیز دارای اهمیت است مکانیسم اثر این داروست که پرداختن به آن نیز خالی از لطف نیست؛ این دارو با عبور از غشای سلوولی به گیرندهای خود در سیتوپلاسم متصل می‌شود و کمپلکس حاصل با اتصال به نواحی خاصی از DNA موجب تحریک روند رونویسی mRNA و به دنبال آن ساخت آنزیم‌هایی می‌گردد که در نهایت مسئول اثرات سیستمیک کورتیکواستروئیدها با جلوگیری از تجمع سلول‌های التهابی در ناحیه التهاب، مهار فاگوسیتوز و آزاد شدن آنزیم‌های مسئول در التهاب و مهار ساخت و آزاد شدن واسطه‌های شیمیایی التهاب، اثرات ضد التهابی خود را اعمال می‌کند (۴).

دگزاماتازون سریعاً و به خوبی از دستگاه گوارش و فرم تزریقی آن نیز از عضله به خوبی جذب می‌شود. بطور عمدۀ در کبد و مقادیری نیز در کلیه و بافت‌ها به متابولیت‌های غیر فعال تبدیل می‌شود. این دارو می‌تواند سبب نتایج منفی کاذب در تست‌های پوستی تزریقی گردد. مصرف این دارو را قبل از انجام تست‌های پوستی، هر نوع جراحی و در صورت ابتلا به عفونت و زخم شدید باید به اطلاع پزشک برسد.

تزریق داخل مفصلی این دارو در مواردی که آرتروپلاستی مفصل، اختلال در لخته شدن خون، شکست داخل مفصلی، استئوپروز، عفونت داخل مفصلی وجود دارد باید با احتیاط صورت گیرد و در صورت بروز قرمزی و تورم در ناحیه تزریق و ادامه و بدتر شدن آن به پزشک مراجعه گردد (۵).

دگزاماتازون هر چند در ابتدای تزریق در ظاهر بیمار را خوب می‌کند ولی ۷۲ ساعت بعد فعالیت ویروس این بیماری را چند

توجه داشت که این افزایش وزن، کاذب بوده و در نتیجه تجمع مایعات و آب در بدن صورت می‌گیرد که اثرات سو آن عبارتند از: این دارو نه تنها باعث افزایش حجم عضلات و توان ورزشکاران نمی‌شوند بلکه بر عکس باعث افزایش تجزیه عضلات و کاهش توده عضلانی فرد و ضعف عضلات خواهد شد، با مصرف این دارو امکان پارگی و آسیب دیدن تاندون‌ها در ورزشکاران هنگام انجام حرکات ورزشی به شدت افزایش خواهد یافت، مصرف این دارو با دوز بالا، موجب تضعیف شدید سیستم ایمنی شده که خود می‌تواند زمینه ساز ابتلا به عفونت‌های شدید شود که بسیار خطرناک بوده و می‌تواند جان فرد را به خطر بیندازد، قطع مصرف این داروها نیز باید تحت نظر پزشک و به تدریج طی برنامه زمان‌بندی خاصی صورت گیرد.

استفاده طولانی مدت دگزاماتازون در کودکان می‌تواند منجر به مهار رشد شود. به دنبال مصرف این دارو ممکن است آزمون‌های بررسی عملکرد هیپوتalamوس-هیپوفیز غده فوق کلیوی دچار اختلال شود. در افراد مسن و به خصوص خانم‌های یائسه، شانس ایجاد پوکی استخوان و افزایش فشار خون، بالا می‌رود. در صورت نیاز به جراحی یا درمان‌های اضطراری و نیز در افراد دیابتی باید احتیاط نمود. در افرادی که دارو را با مقادیر تضعیف کننده سیستم ایمنی دریافت می‌کنند از تزریق واکسن‌های حاوی ویروس‌های زنده باید پرهیز شود.

باید توجه داشت که برای رفع علائم حساسیت‌های ساده و یا مزمن نباید از کورتیکواستروئیدهای سیستمیک (دگزاماتازون) به عنوان درمان اولیه استفاده کرد. این علائم را می‌توان با داروهای ساده‌تر و کم عارضه‌تر نظیر آنتی هیستامین‌ها کنترل کرد (۲).

در سرماخوردگی‌ها و حالات مشابه، با وجود امکان رفع سریع و ظاهری علائم با این داروها باید توجه داشت کورتیکواستروئیدها می‌توانند با تضعیف سیستم ایمنی، زمینه را برای تشدید حالات عفونی فراهم کرده و طول مدت بیماری را افزایش دهنند.

در مورد بیماری‌های التهابی مانند آرتربیت روماتوئید و... نیز توجه به این نکته ضروری است که نباید از کورتیکواستروئید به طور مزمن برای کنترل بیماری استفاده شود، چرا که مصرف طولانی مدت آنها نه تنها نمی‌تواند جلوی پیشرفت بیماری را بگیرد بلکه می‌تواند در درازمدت باعث پیدایش عوارض ناخواسته و مشکلات جدی

نیز بر جای بگذارد. از آنجا که کورتون‌ها جز داروهای پرعارضه محسوب می‌شوند، توجه دقیق بر مصرف صحیح و آگاهانه آنها و پرهیز از تجویز و مصرف نابجا و بی‌رویه این داروها از سوی پزشکان و همچنین بیماران بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس مصرف این داروها باید با تجویز پزشک صورت گیرد و از مصرف خودسرانه آنها جدا پرهیز شود.

تجویز صحیح دگراماتازون برای همگان مهم است ولی برای اطفال از اهمیت بیشتری برخوردار است، مصرف بی‌رویه و ناصحیح آن موجب مهار رشد می‌شود.

باید آگاهی و بررسی کامل مزایا و مضرات دارو در هر بیمار صورت گیرد که این امر نیازمند داشتن اطلاعات و آگاهی دقیق از داروها و بیماری‌ها و نیز شرایط بیماران است.

برابر می‌کند. کورتیکواسترویی‌هایی که برای درمان تجویز می‌شوند چندبرنامه تجویزی دارند که برخی از آن‌ها فقط باید در بیمارستان‌ها و تحت مراقبت‌های ویژه تجویز و مصرف شوند نه در مطب‌ها یا در منازل (۶، ۷).

در صورت فراموش کردن یک نوبت این داروها در رژیم دارویی یک روز در میان، به محض بیادآوردن آن باید در صبح استفاده نمود و چنانچه از صبح گذشته باشد روز بعد دارو را استفاده کرده و یک روز فاصله بادوز بعدی را رعایت کرد.

بحث و نتیجه‌گیری

هر چند کاربرد وسیع داروی دگراماتازون مانند تمام داروها می‌تواند درمانگر و نجات بخش باشد، از سوی دیگر می‌تواند عوارضی را

منابع

- ۱- مصرف بی‌رویه دگراماتازون و خطر افزایش وزن، وبسایت سازمان تدارکات پرشکی جمعیت هلال احمر ایران، دسترسی در تاریخ ۹۰/۰۵/۲۲
- ۲- نقش آمپول دگراماتازون در تشدید ویروس آنفلوانزا، وبسایت جامعه خبری تحلیلی الف، منتشر شده در تاریخ ۹۰/۱/۲۸
- ۳- محسن میمنت، نباید از دگراماتازون به عنوان درمان اولیه استفاده کرد، مجموعه مقالات دندانپزشکی، وبسایت دندانپزشکی دکتر میمنت، منتشر شده در ۱۵ فروردین ۱۳۹۲
- ۴- اطلاعات دارویی مربوط به دگراماتازون، وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دسترسی در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰
- ۵- دگراماتازون، وبسایت شرکت داروسازی تهران شیمی، دسترسی در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰
- ۶- عوارض مصرف نابجا و بی‌رویه آمپول دگراماتازون، وبسایت مجله پزشکی دکتر سلام، دسترسی در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰
- ۷- عوارض مصرف دگراماتازون خوراکی، وبسایت فردا نیوز، منتشر شده در تاریخ ۹۱/۱۱/۷